NipponTree

伽羅木

Taxus cuspidata (var. nana)

KYARABOKU

If du Japon

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

Croissance très lente, feuillage à petites feuilles vert foncé; tronc lisse de couleur rouge-marron. Bourgeons vert clair prenant une couleur vert foncé intense une fois muris; renouvelle son feuillage pendant la maturation des bourgeons (mars-juin).

Soins et entretein

Aime les endroits frais et ventilés, de préférence en mi-ombre; substrat bien drainé à pH neutre; à planter dans une position légèrement rehaussée car craint les stagnations d'eau et à arroser exclusivement quand le terrain est bien sec en surface. Fertiliser au printemps avec des engrais à libération lente. En hiver on conseille un traitement fongicide en préventif suivi par un traitement insecticide à l'huile minérale, ainsi qu'un traitement acaricide en été.

Taille

À l'aide de cisailles à haies bien affûtées pincer les nouveaux bourgeons (uniquement une fois muris), soit avant l'été ou alors en septembre-octobre, éviter en tout cas les mois les plus chauds (juillet-aout).

Curiosité

Toutes les parties de la plante, à l'exception de la chair des arilles, sont toxiques, d'où le nom **«Arbre de la mort»**.

- mi-ombre
- arrosage très modéré
- pH sol à pH neutre
- rustique jusqu'à -20°C