

伽羅木

Taxus cuspidata (var. nana)

KYARABOKU

Tasso**SCHEDA TECNICA****Curiosità**

Tutte le parti della pianta, salvo la polpa dei frutti, sono velenose: da qui deriva il nome **“Albero della morte”**, alludendo alla velenosità della pianta.

Caratteristiche

Crescita molto lenta, foglie piccole verde scuro raccolte in cuspidi; tronco liscio, di colore rosso-cuoio. Germogli color verde chiaro, che a maturazione avvenuta tornano di un verde scuro intenso, con ricambio del fogliame vecchio durante la maturazione (maggio/giugno).

Cure

Ama luoghi freschi e ventilati, preferibilmente in mezz'ombra; terreno di coltura ben drenato dal pH neutro, meglio se messo a dimora leggermente rialzato (teme il ristagno d'acqua); annaffiatura del terreno solo quando è ben asciutto in superficie. Concimazione primaverile con concime a lenta cessione. È consigliato in inverno un trattamento preventivo contro le malattie funginee, seguito da un trattamento insetticida a base di olio minerale, mentre in estate un trattamento estivo con acaricida.

Potatura

Con forbici affilate potare le nuove gemme (solo una volta maturate) prima dell'estate, oppure a settembre/ottobre. Evitare la potatura nei mesi più caldi (luglio/agosto).

 mezz'ombra annaffiatura scarsa**pH** terreno a pH neutro completamente rustica -20°C